昔の医薬療法昼

汎華陽醫解一子桐傳

一瘧疸時咳逆或致咳嗽伍氏曰寿氣入胃令人咳逆肺感於寒
則咳嗽故發瘧而嗽皆肺氣虛寒也
凡愚常見諸腫一寸至三寸者痛也三寸至五寸者痛也五寸至八寸者痛也
者多難言高起皮薄見血黑色者安治雖小平起皮厚堅黑色
者難治又云近筋骨而發者經久不愈無見疔瘡生肩背
腰者充緩發頭面耳鼻口唇舌根唇上及手足肾節間者最
急瘡也略後先聖黃并愚加添而傳門下生之姑揣其要而可
詳之

癜疽初發圖

初發平皮上如小栗粒而中心有毛又云初發如白米粒有白膿

右初發頭上白黃是癜也黑色疽

癰疽漸潰出膿

右臀腫頭上有三白膿宜灸治灸痒不可忍者大痛腫平乃已案黑斯

癰疽漸大發黃

右肉頭上面出膿支湧膿高四寸癰也安治後宜針破

癰疽惡發於面



右初發□潰後瘡口亦宜面坐而俯令膿血流出勿治膿血流出者必癒也余治

瘡瘍外發篇

右腫大而高發生疼痛破後色紅狀如蜂窠有理百人百可治也七日內者灸之以冝敗膿下

癰疽内發圖

右初發時不拘大小身体無恙覚僕息漸々開大不疼生平肉上或白或赤或黒如氣皰漿而亦不發熱月間漸々開大不疼生平肉上或白或赤或黒如氣皰漿而

癰疽数孔図

右癰有数孔ス図
按之諸孔出膿尋ル時有音ヒ
易ク愈ヘ流注ヲ則必ス不治
頭向ヒ下者癒ヘ遇ヒ無キ而

癰疽潰膿穿出圖

右癰疽之不差而膿血之流出如雨復急則入針灸以蝕膿肉膏藥攻之急則入針刀以破之

瀉痘瘡口訣白畨

右瘡圀白色而膿血不着淡滿也
気血枯竭而不潮於瘡口畨
薫ス瘡口良久ハ紙白並高ナ
一ニ艾ヲ満洗一百一夜燒
松香久燻

綾頑童

右綾頑有初娶未子名阿兔其瞳結偏疹
無頭尾纔月余愛此癡兒點兔食與看如死

附骨癰證附骨疽圖

丹溪曰附骨者固厚味及當房後交酒後涉水發

右附骨癰而不同風邪之氣搏骨節故痛深徹骨髓遇寒則痛甚也或有是證而無

內癰并腸癰篇

內癰腸癰者生於腸間或小腹重強按之則痛小便數淋時く汁出復惡寒甲錯腰脊急如腫欲小便有膿或洪數已有膿者膿未有膿其脈遲緊者未有膿其脈數者膿雖或遶臍生瘡或膿自臍出或大便膿出或從手按尤眼右眼先者胸中結癰也若不爾痘內發也

腰痛之圖

右腰痛之症生於肝腎之裏膜外乃肾凍七情尤多致脾虛氣滯而成或感邪邊腎生痛腎中白膿出或大便去膿血多婦人產後在內者則腸癰內癰心癰腎肺癰癰腎癰等々反食積痰飲相亂不可誤治

敗毒流注發黴

右此症因風濕邪毒走流於肌膚之間未潰以前易治既潰之後難治可不慎歟

脚胕脛跟脫疽之圖

右三症者必因氣虛弱消渴病發之潰後膿未盡者難治宜
流氣飲若養元腎氣丸為主

便瀉之圖

右便瀉血症瀉其不便處生故也乃足厥陰肝之経絡及衝任督脉俗呼為便毒亦屬于肝之傍絡是血気流行之道路也今壅而為瀉當以玉燭散或桃仁承気湯下之或名路岐便毒之下迎陵名鷰馬各治處發名同膚気或便毒左右內邊俱名鷰馬各治處發名同

懸癰之圖



夫懸癰之症生於谷道前陰囊之間初發時甚痒狀如粟子漸
如鶉子日久如未成未成或赤腫痛則破大小便從此中而出
不治換難滯而作痛或足三陰虛損患之治法以
治瘡瘍之法救主之

頭後蜂窠發圖

右蜂窠發之症生於後項流兩肩者難治發下者可治起者安治不痛此等患者不治毒氣攻入腦冕

兩股灘痕之畫

右兩股瘡痕之症切忌用補陽之藥蓋虛中得邪忌受猛劑傷胃腑

耳

耳後發之圖

右此證耳之後一寸三分發之必死名鉞毒

龍膽瀉肝湯治耳後發

海藻 龍 海蛤 通 牛 貝母 各三分 昆布 攀石 松蘿 各二分

麹 半 各一分

右細末ノ毎服二分 酒用一切毒物及耳中雞魚卵等忌之

菓忌

兩脚發

右之脚小而後畢遍發攻乃固飲食所致而氣食相閙之治療補神中益氣湯腎氣丸杜裏救為主

腎癰疽發之面

右腎癌之證因受濕并怒氣飲酒而得之傷於腎之間流毒在腎之俞急宜用柔解內腎之毒若陰發傷腎瞋者不可治

肥後發之圖

右肥後發之證名天疽其狀大而紫黑色若不急治則
傷任脉(ニンミヤク)內薰肝肺(カンハイ)十餘日(ニチ)死(シス)急用化痰清瞳托
裏(リ)數(スウ)及

井疽之畫

右井症狀如已三四日起不早治入午漸
牙發可治內發主死無疑
午膿十日死急服內消清心散

藏府腑癰疽之畨

右九發證候部位

門胃痕在中脘大腸痕在天樞三焦痕在冊田小腸痕在關元

其穿潰在外可治若發於內傷膜者流膿大腸出難治

臀癰并無名風瘡之畫



右二症者臀上發癰疽有陽多血亦宜刺此陰中之陰雖曰大陽多血然気運不致血亦空虚来中多後急宜保養吉若無積補之功其禍多在結痂之後犢之血風瘡者非膿瘡亦非外腎風瘡有異

血鬱或恚怒精不出而內敗初起兩足脚跟內腫治療四生丸

腎氣丸或補中益氣丸參而治之

右乳癰症看兒者多吹妳看乃孝者多吹妳初起則用發散流氣之劑已成膿但內托排膿養血須氣慎勿妄用針刀丹溪云乳癰因乳母不知調養一味致盖乳房陽明所經之地不行故令壅久致厥陰之氣不行故令敷

閉而汁不通陽明之血沸騰故撓其血而化為膿或周所
乳之子瞤有滯疾氣燃熱所吹而成結核初
便引心疼掉令痰才軟吃令汁透可收拢其
皮疎厥陰之逆上撓生其中節行寸濁之
血瓜蒌子清瞤毒或加沒矛青橘葉皂角刺金銀當歸身
或湯或散之灸之三壯尤妙打酒尤之又於痛處灸
針口必成指痛不淂共毛角骨成瘡初
凡妳岩始有核如鼓黄甚者大不痛
便宜急服疎氣行血之劑須情思如意則可愈未破者尚可
治成瘡者不可治又云月平已還治之多死也

面

人面瘡苗

右人面瘡之症是寃業所致可以善事解之然後服流気飲又不已苗急先腎気丸或用二貝母末付之

膵俞之畫

右膵俞者肉胃臟虛寒風邪毒氣流注兩脚生瘡膿發外者外膵俞去發處三里之傍灌於陰交之側

風腫并風毒之圖



右風腫之候初發頭大發亦頭胸背冒盛不赤不痛無寒浮在皮上虛腫膿難出不赤痒又作毒腫者兔赤而癢或生瘡藥腫上如灸灼是也又云五毒腫者五藏之毒腫也發於人身所生五藏之

口齒瘡之畫

右發口齒瘡潰爛臭穢血出不止者熛瘡七月死久而膿血多出死不可治一名巾痒瘡之候

氣膿之候

元氣腫者無定在所故無畫其狀如癰而無
急痛也又云氣痛者有一處痛如打不可忍俗醫云瘡口良
久而不合是名氣將不調知矣瘡口雖而不合
者有衰化瘡之論脉細
可治之虛弱之本

手太陰肺經循臂之面

右肺經凡左右共二十二穴是經多氣少血

手陽明大腸經瘡瘍圖

右大腸經凡左右共四十穴是經氣血俱多

足陽明胃經疔疽圖

右足陽明胃經凡右共九十穴是經気血俱多

足太陰脾經絡癰疔之圖

右足太陰脾經凡九名共四十二穴是經多氣少血

手少陰心經穴痘圖

右手少陰心經凡右芸十七穴是經多氣少血

右手太陽小腸經凡十九右共三十八穴是經多血少氣

手太陽小腸經滄痘圖

足太陽膀胱経穴圖

右足太陽膀胱経凡左右共一百二十六穴是経多血多気

足少陰腎經離面圖

右足少陰腎經凡左右共五十四穴

手厥陰心包經痂疥之前

右手厥陰心包經凡有五穴是經多血少氣

手少陽三焦經瀕泣之前

右手少陽三焦經凡左右共二十六穴是經多氣少血

足少陽膽經痂疥圖

右足少陽膽經凡左右共八十六穴是經多氣少血

足厥陰肝經行頭面

右足厥陰肝經凡穴二十六穴是經多血少氣

督脉之瀉血圖

督脉經中行凡二十七穴始長強上屬陽脉之海

任脉之穴道圖

右任脉經元二十四穴起於中極之下至咽喉屬陰脉之海

背五臟六府所生之苗

破針并尖針圖

夫打針法馬喻銭一百煉陽針一枚如韮葉長三寸六分
痘周之面也丁酉之日打瀉針一枚長二寸四分比瀉
鋒鋩長一寸六分初發取瀉出惡血針鈹鈹長四寸
二分半取大瀉膿針打之常紫者未瀉而膿之
針固而妙也



是瀉之針也

是瘟之針之


41
長サ二寸
ミヤチシ
銀箆一
長サ一寸六分
ウスクモロハウチ
是初發取瘡之根
是取大瘡膿
金鍼
是小瘡膿針也
吊切針ニ用之
用吊中

破膿之首

小者用陰針

大者用陽針

曾氏云妄以針刀予破候其潰覚有膿宜急破之早予出膿而膿食肌肉則難治予云瘡頭之下可破令膿易出須先灸而後橫直可劈更六分許未堅腫予可破誤則殺生人不可不擇

騎尒馬灸法并圖

丈治瀉痘發肺發鼻發脾發腮發頰發額發節發腰發眼或發四肢或婦人妳痘不出不問男女一見有此疾者皆可即便用此法灸之

先從男左女右臂腕中曲校紋起用淨筆量至中指腐盡處不量指節則藥斬

次男以左手安右手先屈中指用為量取中間一節兩橫
紋斷為周身一寸為則以子

亦次令病人脫去上下衣服以大丹
足要離地半許兩傍更以兩人扶定每令動搖不穩却易一
畫子則定作杠從尾間起則子尽處不畫量至則子尽處點史

記之非灸穴處此是取中穴止處却以第二之畨取同身寸則
取兩寸手指自中穴量之以中分取兩傍各一寸方是灸穴也

右兩穴或五壯不可多灸發赤者灸
二穴灸煩躁甚者不可周灸法必毒攻臺則必死

瘧痢灸法之圖



凡瘡瘍用灸法則灸其瘡邊老壯亦四面八處各灸二百壯小者灸十六處絡脈大痈者灸八處或大痈灸二百壯小者灸十六處絡脈深而

可灸之
霧梱目左足應春其月戊辰巳巳　鷹
之春其月戊辰巳巳　鷹
應立秋其月戊申巳未右脇股應秋冬其月
日戊戌己亥腰尻下竅應冬至其月壬子六府瞞下三藏應
中州其人禁犬禁犬一所在之日及諸戊己九竅有癰腫者善候八正
所在之處所主左右上下身體有癰腫者砭治之無以其所直之
是謂天忌曰
秋上下外科絡畫一子相伝他見有石數者必里可秘方書
初秋上旬吉旦
北豪通孫
波多野梅江蕃公写

參以四時大者參以處或大病